
















De l'eau dans les selles...





Pr Fabrice Bonneville
Service de Neuroradiologie
CHU Toulouse





Adénome Kystique






kyste :
résorption hémorragie ?




Silent, but not unseen: multimicrocystic aspect on T2-weighted MRI in silent corticotroph adenomas

Laure Cazabat^{*†1}, Martin Dupuy^{‡1}, Anne Boulin[§], Michèle Bernier^{¶1}, Bertrand Bausart[‡], Luc Foubert[‡], Marie-Laure Raffin-Sanson^{*†}, Philippe Caron^{**}, Jérôme Bertherat^{††} and Stéphan Gaillard[‡]

Clinical Endocrinology (2014) 81, 566–572



Silencieux (n=13/17)	Sécrétants (n=3/14)	A gonadotropes non fonctionnels (n=3/57)
76%	21%	5%






Macroadénomes corticotropes silencieux multimicrokystiques en T2



mécanisme ?....

Kyste de Poche Rathke séreux



Contrôle 3









KPR





Taille et signal variables



KPR mucoïdes (25%*)



Position variable














KPR

Lipome

Nanisme




Nodules intrakystiques dans KPR



KPR Intratige







Kyste post-hypo

Post-hypophyse



...et kyste









KPH en ARM : 3%



Crâniofaringiome














**Gliome
hypothalamique**




Kyste ? Ou air ? Pneumatokyste !






Abcès staphylocoque



Remerciements Ch Magny







Kyste arachnoidien




Kyste arachnoïdien


FLAIR





K. arachnoïdien retro sellaire






Kyste épidermoïde







Dynamique : angiome caverneux







Remplissage progressif

Kyste épidermoïde




Kyste Dermoidoide






Kyste dermoïde




the main difference between
Europe and USA



prikk:)








Encéphalocèle intrasellaire










Encéphalocèle
intrasellaire










Persistance du canal craniopharyngien

« Selle vide »

HTIC
Idiopathique







Merci de votre attention !